

術前に投与中止する薬剤と 休薬期間の目安

(当院麻酔科マニュアル)

※あくまでも目安であり合併疾患の病態、治療手技により対応が異なることがあります。

Ⅲ. 1. 術前に投与中止する薬剤と休薬期間の目安

分類	一般名	商品名(2017年2月現在) ※ は当院採用薬	手術までの 休薬期間
抗血小板薬	アスピリン	アスピリン錠100	7日前 ⁴⁾
		アスピリン(末)	
		アスピリン腸溶錠	
		ゼンアスピリン錠100	
		タケルダ(※ランソプラゾールとの配合剤)	
		バイアスピリン100	
	アスピリン・ダイアルミ ネート配合剤	アスファネート配合錠A81	7日前 ⁴⁾
		ニトギス配合錠A81	
		バッサミン配合錠A81	
		バファリン配合錠A81	
		ファモター配合錠A81	
	チクロピジン塩酸塩	ジルペンダー錠100mg	7~10日前 ⁴⁾
		チクロピジン塩酸塩(細粒、錠)	
		パナルジン(細粒、錠)	
		マイトジン錠100mg	
	クロピドグレル塩酸塩	プラビックス25・75	7~14日前 ¹⁾⁴⁾
		クロピドグレル25・75	
	クロピドグレル・アスピリン	コンプラビン	
	プラスグレル塩酸塩	エフィエント3.75mg・5mg	14日前 ¹⁾
	シロスタゾール	コートリズム錠50・100	2~3日前 ⁴⁾
		シロスタゾール(錠50・錠100・OD50・OD100)	
		シロシナミン錠50・100	
		シロスレット内服ゼリー50mg・100mg	
プレタールOD100			
プレタール(散、OD50)			
プレトモール錠50・100			
ホルダゾール錠50・100			
イコサペント酸エチル		アテロパンカプセル300	
	イコサペント酸エチルカプセル300mg		
	イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg・600mg・900mg		
	エパキャップソフトカプセル300mg		
	エパデールカプセル300		
	エパデールS(300・600)		
	エパデールS900		
	エパフィールカプセル300		
	エパラカプセル300		
	エパラ粒状カプセル300mg・600mg・900mg		
	エパロースカプセル300mg		
	エパロース粒状カプセル300mg・600mg・900mg		
	エメラドールカプセル300		
	シスレコンカプセル300		
	ソルミラン顆粒状カプセル600mg・900mg		
	ナサチームカプセル300		
	メルブラールカプセル300		
メルブラール粒状カプセル300mg・600mg・900mg			
オメガ-3脂肪酸エチル イコサペント酸エチル(EPA-E)、ドコサヘキサ エン酸エチル(DHA-E)を含有	ロトリガ粒状カプセル	7~10日前 ²⁾	
チカグレロル	ブリリント錠60mg・90mg	5日前 ¹⁾	
ベラプロストナトリウム	ケアロードLA錠60μg	1日前 ²⁾	
	ドルナー錠20μg		
	プロサイリン錠20		

	ベラプロストナトリウム	プロルナー錠20 μ g・40 μ g	1日前 ²⁾
		ベラススLA錠60 μ g	
		ベラストリン錠20 μ g	
		ベラプロストNa錠20 μ g・40 μ g	
		ベラプロストナトリウム錠20 μ g	
		ベルナール錠20 μ g	
	サルボグレレート塩酸塩	アンブラーグ(50mg・細粒)	1～2日前 ²⁾
		アンブラーグ100	
		サルボグレレート塩酸塩錠50mg・100mg	
抗凝固薬	ワルファリンカリウム	ワーファリン(顆粒、錠5mg)	4日前 ⁴⁾ ヘパリンの皮下注か 持続注に変更する
		ワーファリン錠0.5mg・1mg	
		ワルファリンK(細粒、錠0.5mg・1mg・2mg)	
	ダビガトランエテキシラート	プラザキサ	別表参照 ³⁾
	リバーロキサバン	イグザレルト	1日前 ¹⁾
	エドキサバン	リクシアナ15mg・30mg・60mg	
アピキサバン	エリキュース		
血管拡張薬	リマプロストアルファデクス	オパルモン錠5 μ g	1～2日前 ²⁾
		プロレナール錠5 μ g	
		リマプロストアルファデクス錠5 μ g	
		リマルモン錠5 μ g	
冠血管拡張薬	ジピリダモール	ジピリダモール錠12.5mg・25mg・100mg	2日前 ²⁾
		ペルサンチン錠12.5mg・100mg	
		ペルサンチン(錠25mg、Lカプセル150mg)	
		ペルミルチン錠25	
		ヨウリダモール錠25	
	ジラセブ塩酸塩	コメリアンコーワ錠50・100 ジラセブ塩酸塩錠50mg・100mg	2～3日前 ²⁾

プラザキサ(メ-カ-回答)

腎機能CCr(mL/min)	出血リスク(standard)
>80	24時間
>50to \leq 80	24時間
>30to \leq 50	少なくとも2日

2. 周術期に使用する抗凝固薬で注意すべき薬品

	薬品名
ヘパリン類	ヘパリン注
	ヘパリンカルシウム皮下注
	クレキサン注
	アリクストラ皮下注
経口FXa阻害剤	リクシアナ錠

1) 添付文書

2) 添付文書記載なし。メーカー回答

3) 添付文書に記載されているが、別にメーカー推奨の休薬期間あり

4) 循環器疾患における抗凝固・抗血小板療法に関するガイドライン2009年改訂版を参考

参考文献

日本ジェネリック製薬協会ホームページ <http://www.jga.gr.jp/>

2009年循環器疾患における抗凝固・抗血小板療法に関するガイドライン

医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.info.pmda.go.jp/>

※この表は業務マニュアル内にあります。(診療マニュアル→⑦各科代表的疾患に関する診療指針→麻酔科安全管理)

Ⅲ. 1. 術前に投与中止する薬剤と休薬期間の目安

商品名(2017年2月現在) ※ は当院採用薬	手術までの 休薬期間	一般名
アスピリン錠100	7日前	アスピリン
アスピリン(末)	7日前	アスピリン
アスピリン腸溶錠	7日前	アスピリン
アスファネート配合錠A81	7日前	アスピリン・ダイアルミネート
アテロパンカプセル300	7~10日前	イコサペント酸エチル
アンプラーグ(50mg・細粒)	1~2日前	サルボグレラート塩酸塩
アンプラーグ100	1~2日前	サルボグレラート塩酸塩
イゲザレルト	1日前	リバーロキサバン
イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg・600mg・900mg	7~10日前	イコサペント酸エチル
イコサペント酸エチルカプセル300mg	7~10日前	イコサペント酸エチル
エパキャップソフトカプセル300mg	7~10日前	イコサペント酸エチル
エパデールS(300・600)	7~10日前	イコサペント酸エチル
エパデールS900	7~10日前	イコサペント酸エチル
エパデールカプセル300	7~10日前	イコサペント酸エチル
エパフィールカプセル300	7~10日前	イコサペント酸エチル
エパラカプセル300	7~10日前	イコサペント酸エチル
エパラ粒状カプセル300mg・600mg・900mg	7~10日前	イコサペント酸エチル
エパロースカプセル300mg	7~10日前	イコサペント酸エチル
エパロース粒状カプセル300mg・600mg・900mg	7~10日前	イコサペント酸エチル
エフィエント3.75mg・5mg	14日前	プラスグレレル塩酸塩
エメラドールカプセル300	7~10日前	イコサペント酸エチル
エリキューズ	1~2日前	アピキサバン
オパルモン錠5 μ g	1~2日前	リマプロスタールファデクス
クロピドグレル25・75	7~14日前	クロピドグレル塩酸塩
ケアロードLA錠60 μ g	1~2日前	ペラプロストナトリウム
コートリズム錠50・100	2~3日前	シロスタゾール
コメリアンコーワ錠50・100	2~3日前	ジラゼブ塩酸塩
コンプラビン	7~14日前	クロピドグレル・アスピリン
サルボグレラート塩酸塩錠50mg・100mg	1~2日前	サルボグレラート塩酸塩
シスレコンカプセル300	7~10日前	イコサペント酸エチル
ジピリダモール錠12.5mg・25mg・100mg	2日前	ジピリダモール
ジラゼブ塩酸塩錠50mg・100mg	2~3日前	ジラゼブ塩酸塩
ジルペンダー錠100mg	7~10日前	チクロピジン塩酸塩
シロシナミン錠50・100	2~3日前	シロスタゾール
シロスタゾール(錠50・錠100・OD50・OD100)	2~3日前	シロスタゾール
シロスレット内服ゼリー50mg・100mg	2~3日前	シロスタゾール
ゼンアスピリン錠100	7日前	アスピリン
ソルミラン顆粒状カプセル600mg・900mg	7~10日前	イコサペント酸エチル
タケルダ(※ランソプラゾールとの配合剤)	7日前	アスピリン
チクロピジン塩酸塩(細粒、錠)	7~10日前	チクロピジン塩酸塩
ドルナー錠20 μ g	1~2日前	ペラプロストナトリウム
ナサチームカプセル300	7~10日前	イコサペント酸エチル
ニトギス配合錠A81	7日前	アスピリン・ダイアルミネート
バイアスピリン100	7日前	アスピリン
バッサミン配合錠A81	7日前	アスピリン・ダイアルミネート
パナルジン(細粒、錠)	7~10日前	チクロピジン塩酸塩
バファリン配合錠A81	7日前	アスピリン・ダイアルミネート
ファモター配合錠A81	7日前	アスピリン・ダイアルミネート
プラザキサ	別表参照	ダビガトランエテキシラート
プラビックス25・75	7~14日前	クロピドグレル塩酸塩
ブリリタ錠60・90	5日前	チカグレロル

プレタール(散、OD50)	2～3日前	シロスタゾール
プレタールOD100	2～3日前	シロスタゾール
プレトモール錠50・100	2～3日前	シロスタゾール
プロサイリン錠20	1～2日前	ベラプロストナトリウム
プロルナー錠20 μ g・40 μ g	1～2日前	ベラプロストナトリウム
プロレナール錠5 μ g	1～2日前	リマプロストアルファデクス
ベラサスLA錠60 μ g	1～2日前	ベラプロストナトリウム
ベラストリン錠20 μ g	1～2日前	ベラプロストナトリウム
ベラプロストNa錠20 μ g・40 μ g	1～2日前	ベラプロストナトリウム
ベラプロストナトリウム錠20 μ g	1～2日前	ベラプロストナトリウム
ペルサンチン(錠25mg、Lカプセル150mg)	2日前	ジピリダモール
ペルサンチン錠12.5mg・100mg	2日前	ジピリダモール
ベルナール錠20 μ g	1～2日前	ベラプロストナトリウム
ペルミルチン錠25	2日前	ジピリダモール
ホルダゾール錠50・100	2～3日前	シロスタゾール
マイトジン錠100mg	7～10日前	チクロピジン塩酸塩
メルブラールカプセル300	7～10日前	イコサペント酸エチル
メルブラール粒状カプセル300mg・600mg・900mg	7～10日前	イコサペント酸エチル
ヨウリダモール錠25	2日前	ジピリダモール
リクシアナ15mg・30mg・60mg	1日前	エドキサバン
リマプロストアルファデクス錠5 μ g	1～2日前	リマプロストアルファデクス
リマルモン錠5 μ g	1～2日前	リマプロストアルファデクス
ロトリガ粒状カプセル	7～10日前	オメガ-3脂肪酸エチル
ワーファリン(顆粒、錠5mg)	4日前	ワルファリンカリウム
ワーファリン錠0.5mg・1mg	4日前	ワルファリンカリウム
ワルファリンK(細粒、錠0.5mg・1mg・2mg)	4日前	ワルファリンカリウム

参考文献

日本ジェネリック製薬協会ホームページ <http://www.jga.gr.jp/>
2009年循環器疾患における抗凝固・抗血小板療法に関するガイドライン
医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.info.pmda.go.jp/>

※この表は業務マニュアル内にあります。(診療マニュアル→⑦各科代表的疾患に関する診療指針→麻酔科安全管理)

プラザキサ(メカ-回答)

腎機能CCr(mL/min)	出血リスク(standard)
>80	24時間
>50to \leq 80	24時間
>30to \leq 50	少なくとも2日